

Protocole de dépistage des commotions cérébrales

A l'attention des Médecins de ring, ou médecin de premier secours

Destinataire : Docteur MACHARD MARYANNICK, Médecin fédéral national de la FFBoxe - sous pli confidentiel via PV de la réunion

NOM DU BOXEUR :

PRENOM :

GALA ou entrainement :

Adresse :

Date...../...../..... **Heure**.....

Stade 1 :

Une seule des situations suivantes doit entraîner une décision d'évacuation immédiate vers un service d'urgence par

Tous les moyens jugés appropriés par le Médecin de service :

- Fracture du crâne ;
- Coma, perte de connaissance quelque soit sa durée
- Signe neurologique focal
- Convulsions
- Amnésie : qu'il s'agisse d'un oubli de la date du jour, du lieu, du nom de son adversaire, des événements qui ont précédé ou suivi cet incident.
- Toute situation jugée urgente par le Médecin de service et laissée à sa seule appréciation
- Patients considérés à risque par le Médecin de service en fonction des antécédents (antécédent de traumatisme crânien).

Stade 2 :

Si le boxeur ne présente pas une des situations évoquées dans stade 1, le dépistage doit être effectué à l'aide des 8 items suivants : Le Médecin de service devra avoir le programme de la réunion pour connaître les réponses :

1. Enumération des signes fonctionnels = SF : vertiges, céphalées, trouble visuel, nausées, perte de l'équilibre,...

Présence d'un SF = 1 pt
Présence de plus de 2 SF = 2 pt
Absence de SF = 0 pt

2. **Nom de l'entraîneur** : oui = 0 pt / non = 1pt
3. **Nom du lieu du combat** : oui = 0 pt / non = 1pt
4. **Nom de son adversaire** : oui = 0 pt / non = 1pt
5. **À quel round a eu lieu le malaise** : 0 pt / non = 1pt

6. **EMPAN à l'endroit** :

Choisir un des 3 empan, le lire à voix haute une fois et faire répéter Immédiatement : 58461 ; 63492 ; 87457

Bonne réponse = 0 pt Réponse non adaptée = 1 pt

(Une seule inversion de chiffre est acceptée et considérée comme une bonne réponse).

7. **EMPAN à l'envers de 4 chiffres** : Choisir un des 3 empan, le lire à voix haute au rythme d'un chiffre par seconde et faire répéter immédiatement l'empan à l'envers.

Ex : 5863 ; 6425 ; 8643

Bonne réponse = 0 pt Mauvaise réponse = 1 pt

Là aussi, une seule inversion est considérée comme une bonne réponse.

8. **Donner le jour, le mois et l'année** :

Bonne réponse = 0 pt Mauvaise réponse = 1 pt

TOTAL =
CONCLUSION :

- Si une des situations de l'échelon 1 est remplie
- Si le total du SCORE est supérieur ou égale à 3,

La présomption de Commotion cérébrale est forte : Prendre la décision d'hospitaliser le boxeur.

Remettre au boxeur ou un de ses proches la fiche conseil, que le boxeur soit hospitalisé ou non.

Attention, ce test doit être considéré comme une aide au diagnostic, le Médecin étant et restant le seul juge de sa décision.

Date :

Nom du Médecin :

Signature :

Tampon avec RPPS :